

# SAD: Bolničke infekcije ubiju gotovo 50.000 pacijenata godišnje

Washington, 23.02.2010., 20:54 | D. Ma.



**Gotovo 50.000 američkih pacijenata umire svake godine od trovanja krvi ili upale pluća kao posljedica bolničkih infekcija, pokazalo je istraživanja objavljeno u časopisu 'Archives of Internal Medicine'.**

*290.000 pacijenata u SAD-u dobilo sepsu (Foto: Getty)*

Bolničke sepe i upale pluća u 2006. godini su odnijele **48.000 života**, dovele do 2,3 milijuna dodatnih bolničkih dana i troškova od **8,1 milijarde dolara**, prema studiji Centra za medicinsku dinamiku, ekonomiku i politiku iz Washingtona.

Zajedno, na te dvije bolničke infekcije otpada oko jedne trećine od **1,7 milijuna** bolničkih infekcija od kojih pacijenti u SAD-u obole svake godine, navodi se u istraživanju objavljenom u ponedjeljak. Bolničkoj sepsi i upali pluća godišnje podlegne gotovo polovica od **99.000 umrlih** od bolničkih infekcija u SAD-u, prema izvješću Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

## **290.000 pacijenata dobilo sepsu**

Istraživanje je pokazalo da je kod bolesnika koji su podvrgnuti invazivnoj kirurgiji tijekom početne hospitalizacije, više vjerojatno da će pokupiti sekundarne infekcije dok su u bolnici. Koristeći najveću bazu bolničkih podataka u SAD-u, koja pokriva bolničke otpuste pacijenata u 40 saveznih država, istraživači su procijenili da je **290.000 pacijenata** u bolnicama u SAD-u dobilo sepsu, ili trovanje krvi, za vrijeme hospitalizacije u 2006., dok je **200.000** dobilo upalu pluća.

U mnogim slučajevima, te dvije infekcije, kao i druge koje se dobiju u bolnici, može se spriječiti poboljšanjem higijene u kliničkom okruženju, kazao je Ramanan Laxminarayan, jedan od glavnih autora studije.

'Mi smo uložili malo u stroge metode mjerenja i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite', napisali su u komentaru članka **dr. David Murphy** i **dr. Ivan Pronovost** iz Sveučilišne bolnice **Johns Hopkins** u Baltimoreu.

(Hina)